



# Syndromes de Loge d'Effort Pathologie vasculaire sportive Marc Bouvard



DU Médecine du sport Marrakech 13-14 Avril 2018



### Syndrome de loge d'effort

disparaissant au repos en rapport avec un conflit contenant-contenu, surtout les los le jambe mais aussi les avant-bras THE RESIDENCE L'atteinte est dans 50-80% des cas bilatérale Sports d'endurance ++ entre 20-30 ans



### Diagnostic

- ◆ Douleur de la loge sans irradiations stéréotypée à l'effort (intensité, durée) progressive avec tension gonflement
- Paresthésie ou anesthésie possible en aval
- Disparition progressive des symptômes en récupération
- Examen clinique au repos pauvre : hernie musculaire, voussure de la loge







### Diagnostic

 Mesure de la pression intra-musculaire (PIM) avant et après effort calibré déclenchant les symptômes
 Normal <10 mmHg pathologique > 15 mmHg





## Diagnostics différentiels


- Myosite médicale
- Douleurs projetées notamment radiculaires
- Lésions osseuses tumorales, traumatiques
- ♦ Syndromes canalaires et pathologies vasculaires





### Traitement

- La chirurgie est le seul traitement apportant la guérison
- Aponévrotomie +/- aponévrectomie
- Marche à J2 puis rééducation
- Reprise du sport partielle à 2 mois, totale à 3 mois
- Résultats mitigés 40-80% de bons résultats







# Encadré 55.1 Syndrome de la traversée thoraco-brachiale

- L'atteinte nerveuse donne les symptômes, les atteintes vasculaires en font la gravité.
- Les manœuvres dynamiques cliniques sont orientées vers une évaluation artérielle.
- La recherche d'une anomalie osseuse costale doit être systématique.
- Le traitement passe par une rééducation spécifique de la ceinture scapulaire dans les formes neurologiques. Les formes vasculaires doivent être opérées.

P.Feugier in Médecine du sport pour le praticien Elsevier






### Syndrome de la traversée Thoraco-Brachiale


douleurs, engourdissements manque de force du M.Sup positionnels

ex.clinique comparatif – manoeuvre d'Adson

radiographie (côte cervicale) artériographie dynamique Rééducation de Pitt










P.Feugier in Médecine du sport pour le praticien Elsevier



### Endofibrose Iliaque Externe







### Artère Poplité piégée

Compression de l'artère poplitée entre l'arcade des Add. et l'arcade du soléaire lors de l'ext. de la jambe+flex.dorsale du pied

# Encadré 55.3 Syndrome de l'artère poplitée piégée

- Il s'agit du diagnostic à suspecter devant une claudication surale chez un patient jeune.
- La compression artérielle résulte d'une anomalie embryologique musculaire et/ou artérielle.
- Il nécessite un traitement chirurgical en cas de symptomatologie.



P.Feugier in Médecine du sport pour le praticien Elsevier



### Artère Poplité piégée

Compression de l'artère poplitée entre l'arcade des Add. et l'arcade du soléaire lors de l'ext. de la jambe+flex.dorsale du pied

<30 ans d' cyclisme, natation, danse, basketball Claudication en station debout prolongée, à la marche, lors de certains efforts

Rechercher des signes d'ischémie (pâleur, froideur, paresthésies)

Des signes de compression veineuse (cyanose, œdème)

Echo-doppler dynamique Angio-TDM ou angio-IRM



Traitement chirurgical



